


Click to prove
you're human



dosificación diferente. Esto puede ayudar a evitar que los niveles de esta droga se acumulen demasiado en su cuerpo.En base a la dosificación:Tomar según lo indicado:La tableta oral de Tizanidina se usa para tratamientos a largo o corto plazo. Conlleva a graves riesgos si no lo toma como se lo recetaron.¿Qué sucede si dejo de tomar Tizanidina de forma repentina o no lo tomo más?Si obstrucaliza el tratamiento de forma imprevista, usted correrá el riesgo de tener síntomas de abstinencia. Este riesgo es mayor si ha estado tomando altas dosis del medicamento o si lo toma durante un período prolongado.Los síntomas de abstinencia pueden incluir:Presión arterial alta.Ritmo cardíaco acelerado.Espasmos musculares empeorados.Si decide suspender este medicamento, su médico debe disminuir lentamente su dosis en 2-4 mg por día. Si no toma este medicamento, su sistema muscular puede no mejorar.Recuerde que si omite las dosis o no toma el medicamento según lo programado, es posible que su medicamento no funcione tan bien o que deje de funcionar por completo.Nota: Si olvida demasiadas dosis, puede tener síntomas de abstinencia. Si toma demasiado, podría tener niveles peligrosos de la droga en su cuerpo.Los síntomas de una sobredosis de este medicamento pueden incluir:Cansancio extremo.Confusión.Aumento de la frecuencia cardíaca.Grave disminución de las presiones sanguíneas.Respiración lenta.Si cree que ha tomado demasiado de este medicamento, llame al número reservado de emergencia de su región.¿Qué hacer si olvido una dosis?Tome su dosis tan pronto como lo recuerde. Pero si lo recuerda unas pocas horas antes de su próxima dosis programada, tome solo una. Nunca intente ponerse al día tomando dos dosis a la vez. Esto podría provocar efectos secundarios peligrosos.¿Cómo saber la Tizanidina realmente está funcionando?Debe tener menos síntomas de espasmos musculares. Estos síntomas pueden incluir tensión muscular, dolor o rigidez.Datos de interés sobre la Tizanidina¿Cómo almacenar la Tizanidina?Guarde Tizanidina a temperatura ambiente entre 15-30 ° C (59-86 ° F).Dispense en recipientes con cierre a prueba de niños.Mantenga la Tizanidina y todos sus otros medicamentos fuera del alcance de los niños de la casa para evitar riesgos de ingesta.Aspectos destacados de la Tizanidina:La tableta oral de Tizanidina está disponible como un medicamento genérico y de marca.Marca: Zanaflex.La Tizanidina se usa para controlar los espasmos musculares. A menudo se usa para personas con esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal o espasticidad muscular.Consideraciones importantesTenga en cuenta estas consideraciones si su médico le receta Tizanidina en forma oral:Puede tomar Tizanidine con o sin alimentos. Pero debería ser consistente. Tómelo de la misma manera cada vez.Puede cortar o aplastar las tabletas.No acumule este remedio en lugares frescos, como baños.Cuando viaje:No debe preocuparse por las máquinas de rayos X de los aeropuertos, pues éstas no pueden dañar su fármaco. No obstante, es posible que deba mostrar al personal del aeropuerto la etiqueta de la farmacia de su medicamento.Por ello siempre tenga consigo la caja original con la etiqueta y la receta. No coloque este remedio en la guantera de su automóvil y tampoco lo deje en el mismo.Siempre lleve su medicamento con usted. Cuando vuele, nunca lo ponga en un bolso facturado. Guárdelo en su bolso de mano mejor.Asegúrese de evadir hacer esto cuando hace mucho frío o mucho calor afuera.No cambie entre las formas, cápsula y tableta de Tizanidina:Una vez que comience a tomar este fármaco, no debe cambiar el mismo ni la forma de administración a menos que su médico lo recomiende.Monitoreo clínico:Usted y su médico deben controlar ciertos problemas de salud. Esto puede ayudar a garantizar que permanezca seguro mientras toma Tizanidina. Estos problemas incluyen:Función renal: Los análisis de sangre pueden verificar qué tan bien están funcionando sus riñones. Si sus riñones no están funcionando bien, su médico puede reducir la dosis de este medicamento.Función del hígado: Los análisis de sangre pueden verificar qué tan bien está funcionando su hígado. Si su hígado no está funcionando bien, su médico puede reducir la dosis de este medicamento.Presión arterial: Es posible que su médico le controle la presión arterial para asegurarse de que no baje demasiado mientras toma Tizanidina.